



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر

بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهر

عنوان: مسمومیت دارویی



مسمومیت دارویی

تهیه و تدوین: صفیه جعفروند

تنظیم: دفتر بهبود کیفیت

1396

خواباندن بیمار به پهلو جهت کاهش
خطر آسپیراسیون.

دور کردن عامل مسمومیت و مواد
محرکزا از دسترس بیمار.



روی هر پله ای هستی خدا
یک پله بالاتر از توست نه به خاطر اینکه
خداست بلکه به خاطر این است که دستان
تورا بگیرد به امید شفاعت و سلامتی

در برخورد با بیمارانی که دچار مسمومیت
دارویی شده اند

اولین اقدام در بیماران بامسمومیت دارویی
رساند بیمار به مراکز درمانی می باشد.

- جلوگیری از جذب بیشتر دارو با القا
استفراغ .
- افزایش دفع سموم و داروهای جذب
شده.
- پیشگیری از مسمومیت مجدد
- محدودیت مصرف مایعات چون باعث
جذب داروها استفاده شده توسط بیمار
می شود.



- مشکل در تنفس

- خواب آلودگی

- لرزش در دست و اندام ها

نکته مهم

1- در صورت استفاده از ترامادول نباید رانندگی کرد و از کار در ارتفاعات و کار با استفاده از وسایل برنده خودداری کند.

2- در افت هوشیاری که در مصرف با ترامادول ایجاد میشود باید به تدریج از حالت خوابیده به حالت نشسته در بیاید و کمی استراحت کند و سپس به حالت ایستاده در آید.



از علائم دیگر مسمومیت با بنزودیازپین ها کاهش سطح هوشیاری می باشد و روی حافظه اثر می گذارد.

مسمومیت با ترامادول

ترامادول به عنوان ضد درد استفاده میشود و از خانواده مورفین می باشد.

علائم مسمومیت با ترامادول

- تنگ شدن مردمک چشم

- افت سطح هوشیاری

- تشنج

- گیجی

- سردرد

- بی خوابی

- یبوست

- تهوع

- نارسایی تنفس

مسمومیت داویی

مجموعه ای از اختلالات بدن است که در اثر جذب ماده ای بیگانه که به آن سم گفته می شود بروز می کند.

یکی از شایعترین مسمومیت ها مسمومیت با بنزودیازپین و مسمومیت با ترامادول می باشد.

مسمومیت با بنزودیازپین ها

علائم در بیماران مسمومیت با بنزودیازپینها

- خواب آلودگی

- تکلم نامفهوم

- افت فشار خون

- آهسته شدن حرکات

- تهوع

- استفراغ

- اسهال

- کاهش درجه حرارت